



PROVEE FEROMONAS DE VERRACO PARA ESTIMULAR EL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE CERDAS EN CELO.

BOARBETTER® es una herramienta de manejo para la detección del celo en cerdas reproductoras. Este producto ha sido desarrollado para imitar el efecto de las tres feromonas naturales contenidas en la saliva del verraco (quinolina, androstenona y androstenol). Contiene una solución de tres feromonas sintéticas mezcladas en una combinación única denominada Análogo de Saliva de Verraco (BSA, por sus siglas en inglés, que es el ingrediente activo en BOARBETTER®), que está sujeto a solicitud de patente y/o patente. No contiene productos animales. Las feromonas de verraco son las responsables del "olor sexual" y BOARBETTER® reduce la necesidad del uso de machos recela para la detección de hembras en celo. Esta combinación innovadora ayuda a maximizar la respuesta del comportamiento de apareamiento de la hembra reproductora, ayudando a alcanzar su máximo potencial reproductivo.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes inertes c.s.p.100%

*Boar Saliva Analog (BSA- Análogo de Saliva de Verraco) -

Este producto puede estar protegido por una o varias patentes, o solicitudes de patentes en trámite.

Consulte <https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip> para detalles y estatutos

Primeros auxilios: En caso de inhalación, llevar a la víctima a un lugar con aire fresco. Si es necesario, realizar la respiración artificial y llamar a un médico En caso de contacto con la piel, lávese bien la piel con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, asegúrese de enjuagar adecuadamente separando los párpados con los dedos. Enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, llame a un médico.

En caso de ingestión, si la persona está consciente, enjuáguese la boca con agua y beba luego agua fresca. Consulte a un médico y muestre la etiqueta del producto.

Eliminación: Cumplir con la normativa ambiental. Póngase en contacto con un servicio profesional autorizado de eliminación de residuos para eliminar este producto.

En caso de derrame, evite que el producto llegue a desagües y/o al medio ambiente. Absorber completamente, luego recoger absorbente. Lave el área del derrame. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

INDICACIONES DE USO:

- BOARBETTER® puede usarse solo, sin verraco, o en combinación con un verraco recela para potenciar la exposición a las feromonas. Para obtener buenos resultados, aplicar BOARBETTER® desde el comienzo del celo, generalmente en los días 3-4 después del destete.
- Aplicar 4 ml de BOARBETTER® en el hocico de la hembra (dirigiéndolo hacia las fosas nasales) antes de comprobar si está en celo • Comprobar el reflejo de inmovilidad aplicando presión sobre el lomo.
- Si se utiliza inseminación artificial convencional inseminar a la cerda, si está en celo, siguiendo los protocolos específicos de la granja.
- Si se utiliza IAPC (inseminación artificial poscervical), esperar 30-60 minutos y siempre de acuerdo a los protocolos IAPC específicos de la granja.
- Si la hembra no está en celo, repetir la administración del producto hasta que aparezcan signos de celo, siguiendo los protocolos de detección de celo de la granja.

Manejo:

Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y facial.

Lavarse las manos después de cada uso.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quítese inmediatamente toda la ropa manchada. Lávese la piel con agua o dúchese.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente lejos del calor y de la luz.

No congelar.

Fabricante:

VETOQUINOL SA,

Magny-Vernois 70200 LURE

